

BACCALAUREAT GENERAL

SESSION 2004

MATHÉMATIQUES

SERIE : ES

Spécialité

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 3 heures - COEFFICIENT : 7

Ce sujet comporte 7 pages dont 2 feuilles ANNEXES 1 et 2.

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

*Le candidat doit traiter les quatre exercices.
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements
entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.*

Les feuilles ANNEXES 1 et 2 sont à rendre avec la copie.

Tournez la page S.V.P

EXERCICE 1 (5 points)
Commun à tous les candidats

Pour chacune des questions ci-dessous, une seule des réponses proposées est exacte. On demande de cocher cette réponse sur la feuille ANNEXE 1 (à rendre avec la copie).

Une bonne réponse rapporte 0,5 point. Une mauvaise réponse enlève 0,25 point. L'absence de réponse n'apporte ni n'enlève aucun point.


Si le total des points est négatif, la note globale attribuée à l'exercice est 0.

QUESTIONS	RÉPONSES (à porter sur la feuille ANNEXE 1)
Pour les trois premières questions, A et B sont des événements associés à une expérience aléatoire.	
1) Si B est l'événement contraire de A , alors	<ul style="list-style-type: none"> • $p(A) = 1 + p(B)$ • $p(A) = 1 - p(B)$ • $p(A) = p(B)$
2) Si A et B sont deux événements indépendants et $p(A) \neq 0$, alors	<ul style="list-style-type: none"> • $A \cap B = \emptyset$ • $p(A \cup B) = p(A) \cdot p(B)$ • $p_A(B) = p(B)$
3) Si A et B sont deux événements incompatibles alors	<ul style="list-style-type: none"> • $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ • $p(A) = 1 - p(B)$ • $p(A \cap B) = 1$
4) Soit a un nombre réel strictement positif. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(-ax + 5) =$	<ul style="list-style-type: none"> • $-\infty$ • 0 • $+\infty$
5) La représentation graphique de la fonction logarithme népérien admet	<ul style="list-style-type: none"> • une asymptote verticale • une asymptote horizontale • une tangente horizontale
6) $e^{\ln x} = x$ pour tout x appartenant à	<ul style="list-style-type: none"> • \mathbf{R} • $]0 ; +\infty[$ • $[0 ; +\infty[$
7) Soit un réel a . $\ln(e^a) - 2e + \ln(1) =$	<ul style="list-style-type: none"> • $e^a - 2e + e$ • $e^a - 2e$ • $a - 2e$
8) Soient a et b des réels strictement positifs. $e^{\ln a} + e^{-\ln b} =$	<ul style="list-style-type: none"> • $-ab$ • $a - b$ • $\frac{ab + 1}{b}$
9) Une primitive de la fonction logarithme népérien sur $]0 ; +\infty[$ est :	<ul style="list-style-type: none"> • $x \mapsto \frac{1}{\ln x}$ • $x \mapsto x \times \ln x - x + 3$ • $x \mapsto \ln\left(\frac{1}{x}\right) - 2$
10) Pour tout réel x strictement inférieur à 1, $\ln(1 - x) > 1$ est équivalent à :	<ul style="list-style-type: none"> • $x < 1$ • $x < 1 - e$ • $x > e$

EXERCICE 2 (5 points)

Pour les candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

Le graphe ci-dessous indique, sans respecter d'échelle, les parcours possibles entre les sept bâtiments d'une entreprise importante.



Un agent de sécurité effectue régulièrement des rondes de surveillance. Ses temps de parcours en minutes entre deux bâtiments sont les suivants :

AB : 16 minutes ; AG : 12 minutes ; BC : 8 minutes ; BE : 12 minutes ;
BG : 8 minutes ; CD : 7 minutes ; CE : 4 minutes ; CG : 10 minutes ;
DE : 2 minutes ; EF : 8 minutes ; EG : 15 minutes ; FG : 8 minutes.

Sur chaque arête, les temps de parcours sont indépendants du sens de parcours.

- 1) En justifiant la réponse, montrer qu'il est possible que l'agent de sécurité passe une fois et une seule par tous les chemins de cette usine. Donner un exemple de trajet.
- 2) L'agent de sécurité peut-il revenir à son point de départ après avoir parcouru une fois et une seule tous les chemins ? Justifier la réponse.
- 3) Tous les matins, l'agent de sécurité part du bâtiment A et se rend au bâtiment D.
En utilisant un algorithme que l'on explicitera, déterminer le chemin qu'il doit suivre pour que son temps de parcours soit le plus court possible, et donner ce temps de parcours.

EXERCICE 3 (5 points) Commun à tous les candidats

On considère la courbe donnée en ANNEXE 2, représentative d'une fonction g définie et dérivable sur l'intervalle $I =]0 ; 21]$.

L'ANNEXE 2 est à rendre avec la copie.

La droite tracée sur le graphique est tangente à la courbe au point d'abscisse 1 et passe par l'origine. On prendra 7,4 comme valeur approchée du réel de l'intervalle I pour lequel g atteint son maximum.

- 1) On note g' la fonction dérivée de la fonction g sur l'intervalle I .
Utiliser le graphique pour donner les valeurs de $g(1)$ et $g'(1)$.
(Aucune justification n'est demandée).
- 2) Résoudre graphiquement dans l'intervalle I les trois inéquations ci-dessous (les valeurs lues sur le graphique seront données à 10^{-1} près).
Aucune justification n'est demandée, mais pour l'inéquation (3) les éléments graphiques utiles seront portés sur la courbe de l'ANNEXE 2 :

$$(1) : g(x) \geq 0$$

$$(2) : g'(x) \geq 0$$

$$(3) : g(x) < x.$$

- 3) On admet que pour tout x de l'intervalle I , $g(x) = -4 + ax(3 - b \ln x)$ où a et b sont deux nombres réels. On veut calculer a et b .
 - a. Montrer que pour tout x élément de l'intervalle I :

$$g'(x) = a[3 - b(1 + \ln x)].$$

Exposer le détail des calculs.

- b. À l'aide des valeurs de $g(1)$ et $g'(1)$ obtenues à la question 1), calculer a et b .

EXERCICE 4 (5 points)
Commun à tous les candidats

La subvention accordée par une entreprise à son club sportif était de 3000 € pour l'année 1998. Depuis 1998, l'évolution de la subvention en pourcentage d'une année à l'autre est celle décrite dans le tableau ci-dessous :

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Evolution en pourcentage	+ 17 %	+ 15 %	+ 10 %	+ 9 %	+ 6 %

Par exemple, le taux d'évolution de la subvention de 2000 à 2001 est de 10 %.

- 1)
 - a. Calculer, pour chacune des années, le montant de la subvention attribuée (en euros). Les résultats seront arrondis à l'unité.
 - b. Le responsable sportif se plaint d'une diminution continue des subventions depuis l'année 1999. Quelle confusion fait-il ?

- 2) On admet que le montant de la subvention en 2003 est de 5130 €.
 - a. Calculer le pourcentage de diminution ou d'augmentation de la subvention de 1998 à 2003.
 - b. Si le taux d'évolution de la subvention d'une année à l'autre était fixe et égal à t %, quelle serait la valeur de t arrondie à 10^{-3} près qui donnerait la même augmentation de la subvention entre 1998 et 2003 ?
 - c. Avec ce même taux d'évolution t , quelle serait la subvention, arrondie à l'unité, en 2004 ?

ANNEXE 1
Exercice 1
À rendre avec la copie

Pour chacune des questions ci-dessous, une seule des réponses proposées est exacte. On demande de cocher cette réponse.

Une bonne réponse rapporte 0,5 point. Une mauvaise réponse enlève 0,25 point. L'absence de réponse n'apporte ni n'enlève aucun point.

Si le total des points est négatif, la note globale attribuée à l'exercice est 0.

QUESTIONS	RÉPONSES
Pour les trois premières questions, A et B sont des événements associés à une expérience aléatoire.	
1) Si B est l'événement contraire de A , alors	<input type="checkbox"/> $p(A) = 1 + p(B)$ <input type="checkbox"/> $p(A) = 1 - p(B)$ <input type="checkbox"/> $p(A) = p(B)$
2) Si A et B sont deux événements indépendants et $p(A) \neq 0$, alors	<input type="checkbox"/> $A \cap B = \emptyset$ <input type="checkbox"/> $p(A \cup B) = p(A) \cdot p(B)$ <input type="checkbox"/> $p_A(B) = p(B)$
3) Si A et B sont deux événements incompatibles alors	<input type="checkbox"/> $p(A \cup B) = p(A) + p(B)$ <input type="checkbox"/> $p(A) = 1 - p(B)$ <input type="checkbox"/> $p(A \cap B) = 1$
4) Soit a un nombre réel strictement positif. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(-ax + 5) =$	<input type="checkbox"/> $-\infty$ <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> $+\infty$
5) La représentation graphique de la fonction logarithme népérien admet	<input type="checkbox"/> une asymptote verticale <input type="checkbox"/> une asymptote horizontale <input type="checkbox"/> une tangente horizontale
6) $e^{\ln x} = x$ pour tout x appartenant à	<input type="checkbox"/> \mathbf{R} <input type="checkbox"/> $]0 ; +\infty[$ <input type="checkbox"/> $[0 ; +\infty[$
7) Soit un réel a . $\ln(e^a) - 2e + \ln(1) =$	<input type="checkbox"/> $e^a - 2e + e$ <input type="checkbox"/> $e^a - 2e$ <input type="checkbox"/> $a - 2e$
8) Soient a et b des réels strictement positifs. $e^{\ln a} + e^{-\ln b} =$	<input type="checkbox"/> $-ab$ <input type="checkbox"/> $a - b$ <input type="checkbox"/> $\frac{ab+1}{b}$
9) Une primitive de la fonction logarithme népérien sur $]0 ; +\infty[$ est :	<input type="checkbox"/> $x \mapsto \frac{1}{\ln x}$ <input type="checkbox"/> $x \mapsto x \times \ln x - x + 3$ <input type="checkbox"/> $x \mapsto \ln\left(\frac{1}{x}\right) - 2$
10) Pour tout réel x strictement inférieur à 1, $\ln(1-x) > 1$ est équivalent à :	<input type="checkbox"/> $x < 1$ <input type="checkbox"/> $x < 1 - e$ <input type="checkbox"/> $x > e$

ANNEXE 2
Exercice 3
À rendre avec la copie

