

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

Session 2007

MATHÉMATIQUES

- Série S -

ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ*Durée de l'épreuve : 4 heures**Coefficient : 9***SPECIALITE**

Les calculatrices électroniques de poche sont autorisées,
conformément à la réglementation en vigueur

Le sujet est composé de 5 exercices indépendants. Le candidat doit traiter tous les exercices. Dans chaque exercice, le candidat peut admettre un résultat précédemment donné dans le texte pour aborder les questions suivantes, à condition de l'indiquer clairement sur la copie. La qualité et la précision de la rédaction seront prises en compte dans l'appréciation des copies.

Le sujet comporte deux annexes à rendre avec la copie.

Avant de composer, le candidat s'assurera que le sujet comporte bien 6 pages numérotées de 1 à 6.

EXERCICE 1 (3 points)*Commun à tous les candidats*

L'espace est muni du repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

Soient (P) et (P') les plans d'équations respectives $x+2y-z+1=0$ et $-x+y+z=0$.

Soit A le point de coordonnées $(0; 1; 1)$.

- 1) Démontrer que les plans (P) et (P') sont perpendiculaires.
- 2) Soit (d) la droite dont une représentation paramétrique est :

$$\begin{cases} x = -\frac{1}{3} + t \\ y = -\frac{1}{3} \\ z = t \end{cases} \quad \text{où } t \text{ est un nombre réel.}$$

Démontrer que les plans (P) et (P') se coupent selon la droite (d) .

- 3) Calculer la distance du point A à chacun des plans (P) et (P') .
- 4) En déduire la distance du point A à la droite (d) .

EXERCICE 2 (3 points)*Commun à tous les candidats***1) Restitution organisée de connaissances**

Démontrer la formule d'intégration par parties en utilisant la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions dérivables, à dérivées continues sur un intervalle $[a; b]$.

- 2) Soient les deux intégrales définies par $I = \int_0^\pi e^x \sin x \, dx$ et $J = \int_0^\pi e^x \cos x \, dx$.
 - a) Démontrer que $I = -J$ et que $I = J + e^\pi + 1$.
 - b) En déduire les valeurs exactes de I et de J .

EXERCICE 3 (5 points)

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

La figure est proposée en annexe 1. Elle sera complétée tout au long de l'exercice.

Dans le plan complexe, rapporté au repère orthonormal direct $(O ; \vec{u}, \vec{v})$, on considère les points A, B et C, d'affixes respectives $-5 + 6i$, $-7 - 2i$ et $3 - 2i$.

On admet que le point F, d'affixe $-2 + i$ est le centre du cercle Γ circonscrit au triangle ABC.

1) Soit H le point d'affixe -5 . Déterminer les éléments caractéristiques de la similitude directe de centre A qui transforme le point C en le point H.

2) a) Étant donné des nombres complexes z et z' , on note M le point d'affixe z et M' le point d'affixe z' . Soient a et b des nombres complexes.

Soit s la transformation d'écriture complexe $z' = a\bar{z} + b$ qui, au point M, associe le point M'.

Déterminer a et b pour que les points A et C soient invariants par s . Quelle est alors la nature de s ?

b) En déduire l'affixe du point E, symétrique du point H par rapport à la droite (AC).

c) Vérifier que le point E est un point du cercle Γ .

3) Soit I le milieu du segment [AC].

Déterminer l'affixe du point G, image du point I par l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{2}{3}$.

Démontrer que les points H, G et F sont alignés.

EXERCICE 4 (4 points)*Commun à tous les candidats*

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chaque question, une seule des propositions est exacte. On donnera sur la feuille la réponse choisie sans justification. Il sera attribué un point si la réponse est exacte, zéro sinon.

Dans certaines questions, les résultats proposés ont été arrondis à 10^{-3} près.

1) Un représentant de commerce propose un produit à la vente.

Une étude statistique a permis d'établir que, chaque fois qu'il rencontre un client, la probabilité qu'il vende son produit est égale à 0,2.

Il voit cinq clients par matinée en moyenne. La probabilité qu'il ait vendu exactement deux produits dans une matinée est égale à :

- a) 0,4 b) 0,04 c) 0,1024 d) 0,2048

2) Dans une classe, les garçons représentent le quart de l'effectif. Une fille sur trois a eu son permis du premier coup, alors que seulement un garçon sur dix l'a eu du premier coup. On interroge un élève (garçon ou fille) au hasard. La probabilité qu'il ait eu son permis du premier coup est égale à :

- a) 0,043 b) 0,275 c) 0,217 d) 0,033

3) Dans la classe de la question 2, on interroge un élève au hasard parmi ceux ayant eu leur permis du premier coup. La probabilité que cet élève soit un garçon est égale à :

- a) 0,100 b) 0,091 c) 0,111 d) 0,25

4) Un tireur sur cible s'entraîne sur une cible circulaire comportant trois zones délimitées par des cercles concentriques, de rayons respectifs 10, 20 et 30 centimètres. On admet que la probabilité d'atteindre une zone est proportionnelle à l'aire de cette zone et que le tireur atteint toujours la cible. La probabilité d'atteindre la zone la plus éloignée du centre est égale à :

- a) $\frac{5}{9}$ b) $\frac{9}{14}$ c) $\frac{4}{7}$ d) $\frac{1}{3}$

EXERCICE 5 (5 points)*Commun à tous les candidats*

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $] -1; +\infty [$ par :

$$f(x) = x - \frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

La courbe \mathcal{C} représentative de f est donnée sur le document *annexe 2* que l'on complètera et que l'on rendra avec la copie.

Partie A : Étude de certaines propriétés de la courbe \mathcal{C}

- 1) On note f' la fonction dérivée de f . Calculer $f'(x)$ pour tout x de l'intervalle $] -1; +\infty [$.
- 2) Pour tout x de l'intervalle $] -1; +\infty [$, on pose $N(x) = (1+x)^2 - 1 + \ln(1+x)$.
Vérifier que l'on définit ainsi une fonction strictement croissante sur $] -1; +\infty [$.
Calculer $N(0)$. En déduire les variations de f .
- 3) Soit \mathcal{D} la droite d'équation $y = x$.
Calculer les coordonnées du point d'intersection de la courbe \mathcal{C} et de la droite \mathcal{D} .

Partie B : Étude d'une suite récurrente définie à partir de la fonction f


- 1) Démontrer que si $x \in [0 ; 4]$, alors $f(x) \in [0 ; 4]$.
- 2) On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ pour tout n de \mathbf{N} .
 - a) Sur le graphique de l'*annexe 2*, en utilisant la courbe \mathcal{C} et la droite \mathcal{D} , placer les points de \mathcal{C} d'abscisses u_0, u_1, u_2 et u_3 .
 - b) Démontrer que pour tout n de \mathbf{N} on a : $u_n \in [0 ; 4]$.
 - c) Étudier la monotonie de la suite (u_n) .
 - d) Démontrer que la suite (u_n) est convergente. On désigne par ℓ sa limite.
 - e) Utiliser la **partie A** pour donner la valeur de ℓ .

ANNEXE 1

Candidats ayant suivi l'enseignement de spécialité

À compléter et rendre avec la copie

EXERCICE 3



ANNEXE 2

À compléter et à rendre avec la copie

EXERCICE 5

