

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2008

SUJET SORTI

MATHÉMATIQUES

OBLIGATOIRE

Série : **ES**

Durée de l'épreuve : 3 heures.

Coefficient : 5

Ce sujet comporte 7 pages numérotées de 1 à 7.

Du papier millimétré est mis à la disposition des candidats. (1 feuille)

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

*Le sujet est composé de TROIS exercices indépendants.
Le candidat doit traiter tous les exercices.*

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Exercice 1 (6 points)


(Commun à tous les candidats)

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples. Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées. Une seule de ces réponses est exacte.

On considère une fonction f définie et dérivable sur l'intervalle $[-5 ; \frac{5}{2}]$.

Le plan est muni d'un repère orthonormal.

- La courbe (C_f) représentée ci-dessous est celle de la fonction f .
- Les points A $(0 ; 2)$, B $(1 ; e)$ et C $(2 ; 0)$ appartiennent à la courbe (C_f) .
- Le point de la courbe (C_f) d'abscisse (-5) a une ordonnée strictement positive.
- La tangente (T) en A à la courbe (C_f) passe par le point D $(-2 ; 0)$.
- La tangente en B à la courbe (C_f) est parallèle à l'axe des abscisses.



Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

Partie A : aucune justification n'est demandée.

Une réponse exacte rapporte 0,5 point.

Une réponse fautive enlève 0,25 point.

L'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point.

Si le total des points de la partie A est négatif, la note attribuée à cette partie est ramenée à zéro.

1. On note $f'(0)$ le nombre dérivé de la fonction f en 0. Quelle est sa valeur ?

- a. $f'(0) = 1$ b. $f'(0) = 2$ c. $f'(0) = 0$

On note \ln la fonction logarithme népérien et g la fonction composée $\ln(f)$.

2. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g , noté D_g ?

- a. $]0 ; \frac{5}{2}[$ b. $[-5 ; 2]$ c. $[-5 ; 2[$

3. Quelle est la valeur de $g(0)$?

- a. $g(0) = 2$ b. $g(0) = 0$ c. $g(0) = \ln(2)$

4. On note g' la fonction dérivée de la fonction g . Quelle est la valeur de $g'(1)$?

- a. $g'(1) = e$ b. $g'(1) = 0$ c. $g'(1) = -\frac{1}{e^2}$

5. Quelle est la limite de $g(x)$ quand x tend vers 2 ?

- a. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = -\infty$ b. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$ c. $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = +\infty$

Partie B : chaque réponse doit être justifiée.

Dans cette partie, toute trace de recherche même incomplète ou d'initiative même non fructueuse sera prise en compte dans l'évaluation.

1. A quel intervalle appartient le réel $I = \int_0^2 f(x) dx$?

- a. $[0 ; 3]$ b. $[3 ; 6]$ c. $[6 ; 9]$

2. Parmi les trois courbes jointes en annexe, l'une est la représentation graphique de la fonction dérivée f' de la fonction f . Laquelle ?

- a. La courbe (C_1) b. La courbe (C_2) c. La courbe (C_3)

3. Parmi les trois courbes jointes en annexe, l'une est la représentation graphique d'une primitive F de la fonction f , F étant définie sur l'intervalle $[-5, \frac{5}{2}]$. Laquelle ?

- a. La courbe (C_1) b. La courbe (C_2) c. La courbe (C_3)

Exercice 2 (5 points)

(Pour les candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité)

Le parc informatique d'un lycée est composé de 200 ordinateurs dont:

- 30 sont considérés comme neufs ;
- 90 sont considérés comme récents ;
- les autres sont considérés comme anciens.

Une étude statistique indique que :

- 5 % des ordinateurs neufs sont défectueux ;
- 10 % des ordinateurs récents sont défectueux ;
- 20 % des ordinateurs anciens sont défectueux.

On choisit au hasard un ordinateur de ce parc.

On note les événements suivants :

- N : « L'ordinateur est neuf » ;
- R : « L'ordinateur est récent » ;
- A : « L'ordinateur est ancien » ;
- D : « L'ordinateur est défectueux » ;
- \bar{D} : l'événement contraire de D.

1. Construire un arbre pondéré décrivant la situation.
2. Calculer la probabilité que l'ordinateur choisi soit neuf et défectueux.
3. Démontrer que la probabilité que l'ordinateur choisi soit défectueux est égale à 0,1325.
4. Déterminer la probabilité que l'ordinateur soit ancien sachant qu'il est défectueux. Donner le résultat sous forme décimale arrondi au centième.
5. Pour équiper le centre de ressources de l'établissement, on choisit au hasard 3 ordinateurs dans le parc. On admet que le parc est suffisamment important pour qu'on puisse assimiler ces choix à des tirages successifs indépendants avec remise. Déterminer la probabilité qu'exactement un des ordinateurs choisis soit défectueux. Donner le résultat sous forme décimale arrondi au centième.

Exercice 3 (9 points)

(Commun à tous les candidats)

On se propose d'étudier l'évolution des ventes d'un modèle de voiture de gamme moyenne depuis sa création en 1999.

Les parties I et II peuvent être traitées indépendamment l'une de l'autre.

Partie I

Le tableau suivant donne le nombre annuel, exprimé en milliers, de véhicules vendus les cinq premières années de commercialisation :

Année	1999	2000	2001	2002	2003
Rang de l'année : x_i	0	1	2	3	4
Nombre annuel de véhicules vendus en milliers : y_i	81,3	92,3	109,7	128,5	131,2

1. Dans le plan (P) muni d'un repère orthogonal d'unités graphiques 1cm pour une année sur l'axe des abscisses et 1cm pour 10 milliers de véhicules vendus sur l'axe des ordonnées, représenter le nuage de points associé à la série statistique $(x_i ; y_i)$ pour i entier variant de 0 à 4.

2. L'allure du nuage de points permet d'envisager un ajustement affine.

a. Déterminer les coordonnées du point moyen G de ce nuage.

b. Déterminer l'équation $y = ax + b$ de la droite (D) d'ajustement affine de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés.

c. Placer le point G et tracer la droite (D) sur le graphique précédent.

d. En utilisant l'ajustement affine du b, donner une estimation du nombre de véhicules vendus en 2007.

3. Le tableau suivant donne le nombre annuel de véhicules vendus, exprimé en milliers, de 2003 à 2007 :

Année	2003	2004	2005	2006	2007
Rang de l'année : x_i	4	5	6	7	8
Nombre annuel de véhicules vendus en milliers : y_i	131,2	110,8	101,4	86,3	76,1

a. Compléter le nuage de points précédent à l'aide de ces valeurs.

b. L'ajustement précédent est-il encore adapté ? Justifier la réponse.

c. On décide d'ajuster le nuage de points associé à la série statistique $(x_i ; y_i)$, pour i entier variant de 4 à 8, par une courbe qui admet une équation de la forme $y = e^{cx+d}$.

Déterminer les réels c et d pour que cette courbe passe par les points A (4 ; 131,2) et B (8 ; 76,1).
On donnera la valeur exacte, puis l'arrondi au millième de chacun de ces nombres réels.

Partie II

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[4 ; 10]$ par : $f(x) = e^{-0,136x+5,421}$.

On suppose que f modélise en milliers l'évolution du nombre annuel de véhicules vendus à partir de l'année 2003.

1. Déterminer le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[4 ; 10]$.
2. Tracer la courbe (C) représentative de la fonction f dans le même repère que le nuage de points.
3. L'entreprise décide d'arrêter la fabrication du modèle l'année où le nombre annuel de véhicules vendus devient inférieur à 65 000.
 - a. Résoudre algébriquement dans l'intervalle $[4 ; 10]$ l'inéquation $f(x) \leq 65$.
En quelle année l'entreprise doit-elle prévoir cet arrêt ?
 - b. Retrouver graphiquement le résultat précédent en laissant apparents les traits de construction nécessaires.

Annexe
Exercice 1, partie B

