

Bac S – France – septembre 2009

Exercice 1 (6 points)

Commun à tous les candidats

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $f(x) = \ln(x^2 + 4)$.

PARTIE A

- 1) Étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
- 2) Soit g la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$ par $g(x) = f(x) - x$.
 - a) Étudier le sens de variation de la fonction g sur l'intervalle $[0 ; +\infty[$.
 - b) Montrer que sur l'intervalle $[2 ; 3]$ l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution que l'on notera α .
Donner la valeur arrondie de α à 10^{-1} .
 - c) Justifier que le nombre réel α est l'unique solution de l'équation $f(x) = x$.

PARTIE B

Dans cette partie, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.

On considère la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n par : $u_{n+1} = f(u_n)$.

La courbe \mathcal{C} représentative de la fonction f et la droite Δ d'équation $y = x$ sont tracées sur le graphique donné en annexe (à rendre avec la copie).

- 1) À partir de u_0 , en utilisant la courbe \mathcal{C} et la droite Δ , on a placé u_1 sur l'axe des abscisses. De la même manière, placer les termes u_2 et u_3 sur l'axe des abscisses en laissant apparents les traits de construction.
- 2) Placer le point I de la courbe \mathcal{C} qui a pour abscisse α .
- 3)
 - a) Montrer que, pour tout nombre entier naturel n , on a : $1 \leq u_n \leq \alpha$.
 - b) Démontrer que la suite (u_n) converge.
 - c) Déterminer sa limite.

Exercice 2 (5 points)

Commun à tous les candidats

L'espace est muni d'un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

- 1) On désigne par \mathcal{P} le plan d'équation $x + y - 1 = 0$ et par \mathcal{P}' le plan d'équation $y + z - 2 = 0$.

Justifier que les plans \mathcal{P} et \mathcal{P}' sont sécants et vérifier que leur intersection est la droite \mathcal{D} ,

dont une représentation paramétrique est :
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 2 - t \end{cases}, \text{ où } t \text{ désigne un nombre réel.}$$

- 2) a) Déterminer une équation du plan \mathcal{R} passant par le point O et orthogonal à la droite \mathcal{D} .

b) Démontrer que le point I, intersection du plan \mathcal{R} et de la droite \mathcal{D} , a pour coordonnées $(0; 1; 1)$.

- 3) Soient A et B les points de coordonnées respectives $(-\frac{1}{2}; 0; \frac{1}{2})$ et $(1; 1; 0)$.

a) Vérifier que les points A et B appartiennent au plan \mathcal{R} .

b) On appelle A' et B' les points symétriques respectifs des points A et B par rapport au point I.

Justifier que le quadrilatère ABA'B' est un losange.

c) Vérifier que le point S de coordonnées $(2; -1; 3)$ appartient à la droite \mathcal{D} .

d) Calculer le volume de la pyramide SABA'B'.

On rappelle que le volume V d'une pyramide de base d'aire b et de hauteur h est :

$$V = \frac{1}{3} b \times h.$$

Exercice 3 (4 points)

Commun à tous les candidats

PARTIE A

Soit f la fonction définie sur l'ensemble des nombres réels par $f(x) = e^x$.

On appelle \mathcal{C}_f la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Soit a un nombre réel. Démontrer que la tangente à la courbe \mathcal{C}_f au point M d'abscisses a coupe l'axe des abscisses au point P d'abscisse $a - 1$.
- 2) Soit N le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Démontrer que $\overrightarrow{NP} = -\vec{i}$.

PARTIE B


Soit g une fonction dérivable sur l'ensemble des nombres réels telle que $g'(x) \neq 0$ pour tout nombre réel x .

On appelle \mathcal{C}_g la courbe représentative de la fonction g dans un repère orthonormal $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

Soit a un nombre réel. On considère le point M de la courbe \mathcal{C}_g d'abscisse a et le point N projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses.

Soit P le point d'intersection de la tangente T_a à la courbe \mathcal{C}_g au point M avec l'axe des abscisses.

Le graphique ci-dessous illustre la situation de la partie B.



- 1) Démontrer que le point P a pour coordonnées $\left(a - \frac{g(a)}{g'(a)}; 0\right)$.
- 2) *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*
Existe-t-il une fonction g vérifiant $g(0) = 2$ et $\overrightarrow{NP} = \vec{i}$?

Exercice 4 (5 points)

Candidats n'ayant pas suivi l'enseignement de spécialité

Un réparateur de vélo a acheté 30 % de son stock de pneus à un premier fournisseur, 40 % à un deuxième et le reste à un troisième.

Le premier fournisseur produit 80 % de pneus sans défaut, le deuxième 95 % et le troisième 85 %.

- 1) Le réparateur prend au hasard un pneu de son stock.
 - a) Construire un arbre de probabilité traduisant la situation, et montrer que la probabilité que ce pneu soit sans défaut est égale à 0,875.
 - b) Sachant que le pneu choisi est sans défaut, quelle est la probabilité qu'il provienne du deuxième fournisseur ? On donnera la valeur arrondie du résultat à 10^{-3} .
- 2) Le réparateur choisit dix pneus au hasard dans son stock. On suppose que le stock de pneus est suffisamment important pour assimiler ce choix de dix pneus à un tirage avec remise de dix pneus.

Quelle est alors la probabilité qu'au plus un des pneus choisis présente un défaut ? On donnera la valeur arrondie à 10^{-3} .
- 3) On note X la variable aléatoire qui donne le nombre de kilomètres parcourus par un pneu, sans crevaison.

On fait l'hypothèse que X suit une loi exponentielle de paramètre λ .

On rappelle que, pour tout nombre réel k positif : $p(X \leq k) = \int_0^k \lambda e^{-\lambda x} dx$.

 - a) Montrer que $p(500 \leq X \leq 1000) = e^{-500\lambda} - e^{-1000\lambda}$.
 - b) *Dans cette question, toute trace de recherche, même incomplète, ou d'initiative même non fructueuse, sera prise en compte dans l'évaluation.*

La probabilité que le pneu parcoure entre 500 et 1000 kilomètres sans crevaison étant égale à $\frac{1}{4}$, déterminer la valeur arrondie à 10^{-4} du paramètre λ .

ANNEXE de l'EXERCICE 1

(À rendre avec la copie)

