

# BACCALAURÉAT GÉNÉRAL

SESSION 2014

## SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Série S

Durée de l'épreuve : 3h30

Coefficient : 6

*L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.*

*Dès que le sujet est remis, assurez-vous qu'il est complet.*

*Ce sujet comporte 5 pages numérotées de 1/5 à 5/5.*

**Partie I (8 points)**  
**Méiose et diversité des gamètes**

**Question :**

**Expliquer comment la méiose permet la diversité génétique des gamètes en vous limitant au cas d'un individu hétérozygote pour trois gènes.**

*Vous illustrerez votre raisonnement par des schémas successifs\* en partant d'une cellule possédant deux paires de chromosomes.*

- *La première paire porte le gène A (allèles A1 et A2) et le gène B (allèles B1 et B2).*
- *La seconde paire porte le gène C (allèles C1 et C2).*

*Votre exposé comportera une introduction, un développement structuré et une conclusion.*

*\* Il n'est pas attendu que toutes les étapes de la méiose soient schématisées.*

**Partie II : Exercice 1 (3 points)**  
**Des mouvements verticaux en Scandinavie**


La lithosphère terrestre est animée de mouvements horizontaux liés à des phénomènes de convergence ou de divergence. Elle est affectée également par des mouvements verticaux, comme par exemple en Scandinavie.

**Question**

**Montrer que les données extraites des documents confirment et précisent\* l'existence de mouvements verticaux en Scandinavie et permettent de formuler une hypothèse quant à leur origine.**


*\* des valeurs sont attendues.*

**DOCUMENT 1 - Soulèvement de la Scandinavie depuis 6000 ans**



*D'après la planète Terre, J.M Caron et coll.*

**DOCUMENT 2 - Variations en altitude de la balise GPS positionnée près de Vasaa en Finlande.**



**Partie II : Exercice 2 (5 points)**  
**Immunité et sclérose en plaques**

La sclérose en plaques (SEP) est une pathologie chronique fréquente affectant le système nerveux central. Elle touche actuellement près de 2,5 millions de personnes dans le monde. Les symptômes sont variés (fatigue, troubles moteurs, sensitifs, difficultés de concentration, troubles de la mémoire) et finissent par altérer profondément la qualité de vie des patients.

La prise en charge médicale comprend différents traitements agissant sur les mécanismes ou les conséquences de la maladie.

**Question :**

À partir de l'exploitation des documents et de vos connaissances, expliquer :

- en quoi la sclérose en plaques est due à un dérèglement de la réponse immunitaire,
- pourquoi le venin de scorpion ouvre une voie thérapeutique intéressante dans son traitement.

**DOCUMENT 1 – Sclérose en plaques et myéline**

La myéline est une substance biologique qui s'enroule autour des neurones. Elle constitue une gaine qui protège les fibres nerveuses et permet une augmentation de la vitesse de conduction de l'influx nerveux d'un facteur 50 à 100.

La sclérose en plaques se traduit par des zones de dégradation de la myéline autour de certaines fibres nerveuses du système nerveux central. On parle de démyélinisation.

Une altération des axones eux-mêmes peut se produire.

**DOCUMENT 2 – Des données biologiques**

On sait que les vaisseaux sanguins présents dans le cerveau sont très peu perméables aux cellules. On parle de « barrière hémato-encéphalique ». Celle-ci n'est normalement pas franchie par les lymphocytes.

Le tableau suivant recense certains types de cellules immunitaires autoréactives (dirigées contre la myéline) présentes dans le sang et le système nerveux central (SNC) chez les individus atteints de sclérose en plaques et chez les individus non atteints.

Cellules	Individus Non atteint		Atteint	
	Sang	SNC	Sang	SNC
Lymphocytes T CD4 et CD8 auto-réactifs anti-myéline	Rares	Absents	Rares mais activés et réactifs	Abondants, très réactifs, producteurs de cytokines*
Lymphocytes B auto-réactifs anti-myéline	Rares	Absents	Rares	Abondants, activés et producteurs d'anticorps anti-myéline

*D'après Étude du rôle effecteur et régulateur des lymphocytes T dans la Sclérose en Plaques par Ségolène Pettré, et B cell characterization and reactivity analysis in multiple sclerosis par Judith Fraussen et al, 2009*

\* Les cytokines regroupent diverses molécules qui activent les macrophages et la différenciation des lymphocytes B et CD8 en cellules effectrices.

### DOCUMENT 3 – Action des peptides de venin de scorpion


Le traitement de la maladie associe classiquement des anti-inflammatoires et des molécules réduisant la réponse immunitaire (immunosuppresseurs). Cette thérapie agit de façon peu spécifique et présente des effets secondaires.

L'équipe de Ferreira et Cesar a publié en 2011 les résultats d'une étude sur l'effet de composants d'un venin de scorpion (*Vaejovis mexicanus smithi*) sur les canaux à potassium. Ces canaux sont des protéines présentes dans la membrane plasmique de cellules de nombreux tissus, y compris le cœur et le cerveau. Ils règlent le passage des ions potassium et sont indispensables au bon fonctionnement des cellules. Les canaux Kv1.3 sont presque exclusifs des lymphocytes T et extrêmement abondants sur les lymphocytes T auto-réactifs. Leur ouverture est indispensable à la prolifération cellulaire.

Le graphique suivant a été obtenu après l'application *in vitro* du venin sur différents canaux à potassium (Kv1.1, Kv1.2, Kv1.3, IKCa1).

#### Effet du venin de scorpion sur différents canaux à potassium

Intensité du courant de potassium (nA)



L'intensité du courant est liée à la quantité d'ions potassium empruntant le canal, donc à l'activité de ce canal.

D'après EP2158213 B1, Batista Cesar Vicente Ferreira, 2011